Nome popular: Bugio-ruivo
Nome científico: *Alouatta guariba* (Humboldt,1812)
Ordem: Primates
Família: Atelidae

Foto: Cláudio Dias Timm (Macho)

Tamanho: 90 cm a 1,3 m.
Peso: 4 a 9 kg.
Alimentação: Folhas, flores, frutos, pinhões e brotos.
Habitat: Áreas florestadas, geralmente permanecendo no topo das árvores.
Distribuição geográfica: Da Bahia ao Rio Grande do Sul e na Argentina.
Nível de extinção: Quase ameaçado (Mendes, S.L., Rylands. A.B., Kierulff, M.C.M. & de Oliveira, M.M. 2008.- IUCN,2008). Vulnerável (CONSEMA, 2011; ICMBIO 2018).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Cuíca-marrom
Nome científico: *Monodelphis dimidiata* (Wagner, 1847)
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Foto: Emanuelle Pasa

Tamanho: 9,2 a 23,1 cm.
Peso: 40 a 84 g.
Alimentação: Artrópodes (insetos e aracnídeos), pequenos vertebrados e frutos.
Habitat: Floresta, área cultivada.
Distribuição geográfica: Norte da Argentina, Uruguai e no Brasil no estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Teta, P. & Martin, G.M. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Capivara
Nome científico: *Hydrochaeris hydrochaeris* (Humboldt,1812)
Ordem: Rodentia
Família: Caviidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 1,0 a 1,30 m.
Peso: 80 kg.
Alimentação: Plantas aquáticas e vegetais em geral.
Habitat: Área florestada, campo, próximo de rios, lagos e banhados.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Reid, F. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Cuíca-de-quatro-olhos
Nome científico: *Philander frenatus.* (Olfers, 1818)
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Foto: Emanuelle Pasa

Tamanho: 24 a 32,7 cm.
Peso: 220 a 680 g.
Alimentação: Pequenos invertebrados, vertebrados e carniça.
Habitat: Floresta, em áreas grandes com bastante quantidade de serrapilheira.
Distribuição geográfica: De Salvador, ao norte do Rio Grande do Sul, estendendo-se ao leste até o sul do Paraguai e província de Misiones na Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (de la Sancha, N., Brito, D. & Costa, L. 2016-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Esquilo-da-mongólia
Nome científico: *Meriones unguiculatus* (Milne-Edwards, 1867)
Ordem: Rodentia
Família: Muridae

Foto: Joachim S. Müller

Tamanho: Até 12 cm.
Peso: 50 a 100 g.
Alimentação: Grãos, gramíneas, frutos e vegetais.
Habitat: Deserto argiloso ou arenoso, pasto, campos e montanhas.
Distribuição geográfica: Mongólia, Sul da Sibéria e Norte da China.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Batsaikhan, N. & Tsytsulina, K. 2016-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Furão-pequeno
Nome científico: *Galictis cuja* (Molina, 1782)
Ordem: Carnivora
Família: Mustelidae

Foto: Ken Erickson

Tamanho: 55 a 64 cm.
Peso: 1,0 a 3,0 kg.
Alimentação: Pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e frutos.
Habitat: Floresta, área aberta e capoeira. Nos troncos de árvores, pedras, ou em tocas.
Distribuição geográfica: No Brasil, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do Sudoeste do Peru, oeste e sul da Bolívia, Paraguai, região central do Chile e Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Helgen, K. & Schiaffini, M. 2016-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Gambá-de-orelha-branca
Nome científico: *Didelphis albiventris* (Lund, 1840)
Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae

Foto: Emanuelle Pasa

Tamanho: 60 cm a 1,3 m.
Peso: 500 g a 2,75 kg.
Alimentação: Insetos, pequenos vertebrados, ovos, cascas, frutos e plantas.
Habitat: Floresta, capoeira, campo, área rural e urbana.
Distribuição geográfica: Brasil (exceto na Amazônia). Paraguai, Uruguai, região norte e central da Argentina e do sul da Bolívia.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Costa, L.P., Astua de Moraes, D., Brito, D., Soriano, P. & Lew, D. 2015-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Gato-do-mato-pequeno
Nome científico: *Leopardus guttulus* (Schreber, 1775)
Ordem: Carnivora
Família: Felidae

Fotos: A. Cambari

Tamanho: 60 a 85 cm
Peso: 1,5 a 3,5 kg.
Alimentação: Pequenos mamíferos, aves e répteis.
Habitat: Floresta, campo e vegetação densa.
Distribuição geográfica: No Brasil, nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da Costa Rica ao Norte da Argentina.
Nível de extinção: Vulnerável (ICMBIo, 2018 / de Oliveira, T., Trigo, T., Tortato, M., Paviolo, A., Bianchi, R. & Leite-Pitman, M.R.P. 2016-IUCN, 2014).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Gato-maracajá
Nome científico: *Leopardus wiedii* (Schinz, 1821)
Ordem: Carnivora
Família: Felidae

Foto: Tadeu G. de Oliveira

Tamanho: 48 a 79 cm.
Peso: 2,6 a 4 kg.
Alimentação: Vertebrados de pequeno e médio porte, artrópodes e frutos.
Habitat: Floresta e mata ciliar.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil, exceto Ceará e Rio Grande do Sul.
Nível de extinção: Vulnerável (ICMBIO, 2018); Quase ameaçada (de Oliveira, T., Paviolo, A., Schipper, J., Bianchi, R., Payan, E. & Carvajal, S.V. 2015. -IUCN, 2014).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Gato-mourisco
Nome científico: *Puma yagouaroundi* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Ordem: Carnivora
Família: Felidae

Foto: Joachim S. Müller

Tamanho: 80 a 120 cm.
Peso: 4 a 9 kg.
Alimentação: Artrópodes, peixes, anfíbios, répteis, roedores, aves e lebres.
Habitat: Floresta densa, borda de floresta, mata ciliar e área aberta.
Distribuição geográfica: Brasil, exceto estado do Rio Grande do Sul. Do sul do Texas (Estados Unidos) até Buenos Aires (Argentina).
Nível de extinção: Vulnerável (ICMBIO, 2018). Pouco preocupante (Caso, A., de Oliveira, T. & Carvajal, S.V. 2015.-IUNC, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Graxaim-do-mato
Nome científico: *Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766)
Ordem: Carnivora
Família: Canidae

Foto: Wilamir Branco

Tamanho: 92 a 1,20 cm.
Peso: 5 a 8 kg.
Alimentação: Vegetais, frutos, invertebrados, peixes, anfíbios, lagartos, cobras, pássaros, roedores, carniça e rejeitos humanos.
Habitat: Floresta, borda de floresta, campo e área alterada habitada pelo homem.
Distribuição geográfica: No Brasil, exceto no estado do Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Do Uruguai ao norte da Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guianas, Suriname.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Lucherini, M. 2015.-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Guaxinim
Nome científico: *Procyon cancrivorus* (Cuvier, 1798)
Ordem: Carnivora
Família: Procyonidae

Foto: A. Gambarini

Tamanho: 80 cm a 1,10 m.
Peso: 2,5 a 10 kg.
Alimentação: Peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios, insetos, sementes, frutos e pequenos mamíferos.
Habitat: Floresta, capoeira, manguezais e mata ciliar.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Da America Central até o Uruguai, nordeste da Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Reid, F., Helgen, K. & González-Maya, J.F. 2016. -IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Macaco-prego
Nome científico: *Sapajus nigritus* (Goldfuss, 1809)
Ordem: Primates
Família: Cebidae

Foto: Miguel Scapin

Tamanho: 72,5 a 104,2 cm.
Peso: 1,4 a 4,8 Kg.
Alimentação: Insetos e frutos.
Habitat: Floresta.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil.
Nível de extinção: Quase ameaçada (Kierulff, M.C.M., Mendes, S.L. & Rylands, A.B. 2015.-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-orelhudo
Nome científico: *Histiotus velatus* (I. Geoffroy, 1824)
Ordem: Chiroptera
Família: Vespertilionidae

Foto: Vinícius C. Cláudio

Tamanho: 14,1 a 17,7 cm.
Peso: Até 11 g.
Alimentação: Insetos.
Habitat: Fragmento florestal e área urbana.
Distribuição geográfica: No Brasil nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Distrito Federal, Maranhão e Piauí. Bolívia, Paraguai e Argentina.
Nível de extinção: Sem dados (González, E.M. & Barquez, R. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-das-frutas
Nome científico: *Artibeus lituratus (Olfers, 1818)*
Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae

Foto: Celso Margraf

Tamanho: 5,5 a 7,9 cm.
Peso: 90g.
Alimentação: Frutos, insetos, recursos florais e foliares.
Habitat: Floresta, área urbana e área rural.
Distribuição geográfica: No Brasil, exceto em Tocantins e Rio Grande do Norte. México, Bolívia e Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Barquez, R., Perez, S., Miller, B. & Diaz, M. 2015.-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morceguinho-das-casas
Nome Científico: *Tadarida brasiliensis* (Geoffroy, 1824)
Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 13,1 a 15,4 cm.
Peso: 13 g.
Alimentação: Insetos.
Habitat: Em fresta de cavernas e áreas urbanas.
Distribuição geográfica: No Brasil, estado da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Estados Unidos até a Bolívia, Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Barquez, R., Diaz, M., Gonzalez, E., Rodriguez, A., Incháustegui, S. & Arroyo-Cabrales, J. 2015-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-de-cauda-grossa
Nome Científico: *Molossus molossus* (Pallas, 1766)
Ordem: Chiroptera
Família: Molossidae

Foto: Roberto L. M. Novaes

Tamanho: 2,8 a 6 cm.
Peso: 13 g.
Alimentação: Insetos.
Habitat: Floresta, campo e área urbana.
Distribuição geográfica: No Brasil, em Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. Estados Unidos, México até o Peru, Norte do Paraguai, Uruguai, Guianas, Venezuela.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Barquez, R., Rodriguez, B., Miller, B. & Diaz, M. 2015-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-fruteiro
Nome Científico: *Sturnira lilium* (Geoffroy, 1810)
Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae

Foto: Roberto L. M. Novaes

Tamanho: 9 a 16,2 cm.
Peso: 15 a 20 g.
Alimentação: Frutos.
Habitat: Floresta.
Distribuição geográfica: No Brasil, em Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. México, Sul da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Norte da Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Velazco, P. & Patterson, B. 2017-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-grisalho
Nome Científico: *Lasiurus cinereus (Schober and Grimmberger, 1997)*
Ordem: Chiroptera
Família: Vespertilionidae

Foto: Merlin D. Tuttle

Tamanho: 9 a 13 cm.
Peso: 18 g.
Alimentação: Insetos.
Habitat: Floresta e área urbana.
Distribuição geográfica: Brasil, nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Colômbia, Venezuela até a região central do Chile, Bolívia, Uruguai, região central da Argentina, Estados Unidos (Havaí), Guatemala, México, Canadá, Equador.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Gonzalez, E., Barquez, R. & Arroyo-Cabrales, J. 2016-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Morcego-vampiro
Nome Científico: *Desmodus rotundus* (Geoffroy, 1810)
Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae

Foto: Wilamir Branco

Tamanho: 12,1 a 15,3 cm.
Peso: 25 a 40 g.
Alimentação: Sangue.
Habitat: Mata ciliar, caverna, minas, ocos de árvores e edifícios abandonados.
Distribuição geográfica: Brasil, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. México, Bolívia, norte do Chile, Paraguai, Uruguai até o norte da Argentina.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Barquez, R., Perez, S., Miller, B. & Diaz, M. 2015.-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Onça-pintada
Nome Científico: *Panthera onca* (Linnaeus, 1758)
Ordem: Carnivora
Família: Felidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 2,45 a 3,15 m.
Peso: 61 a 158 kg.
Alimentação: Capivaras, catetos, queixadas, veados, jacarés, tatus, pacas, macacos, quatis, tartarugas e peixes. Além de ovinos, bovinos e outros.
Habitat: Interior de floresta densa, borda de floresta e campo com capões.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Argentina e planícies costeiras do México.
Nível de extinção: Perigo crítico (CONSEMA, 2011). Vulnerável (ICMBIO, 2018). Quase ameaçada (Quigley, H., Foster, R., Petracca, L., Payan, E., Salom, R. & Harmsen, B. 2017.-IUCN, 2017).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Ouriço-cacheiro
Nome Científico: *Coendou spinosus* (F. Cuvier, 1823)
Ordem: Rodentia
Família: Erethizontidae

Foto: Fabio Manfredini

Tamanho: 54,9 a 83 cm.
Peso: 5 kg.
Alimentação: Frutos, sementes, cascas de árvores e até folhas.
Habitat: Florestas e campos com árvores esparsas.
Distribuição geográfica: No Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná ao Rio Grande do Sul.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Roach, N. & Naylor, L. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Preá
Nome Científico: *Cavia aperea* (Erxleben, 1777)
Ordem: Rodentia
Família: Caviidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 26,5 a 31 cm.
Peso: 550 a 760 g.
Alimentação: Gramíneas e sementes.
Habitat: Borda de mata e mata ciliar.
Distribuição geográfica: No Brasil ocorre do estado de Pernambuco até São Paulo. Colômbia, Equador, Venezuela, Guianas, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Bernal, N. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Puma
Nome Científico: *Puma concolor* (Linnaeus, 1771)
Ordem: Carnivora
Família: Felidae

Foto: Picasa / Creative Commons

Tamanho: 149,6 a 274,3 cm.
Peso: 36 a 103 kg.
Alimentação: Porco-do-mato, veado, lebre, pequenos roedores, tatu, macaco, aves e répteis. Além de ovinos, bovinos e outros.
Habitat: Floresta densa e suas bordas, área aberta e florestas alteradas.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil, exceto o estado do Rio Grande do Sul.
Nível de extinção: Vulnerável (Consema, 2011; ICMBIO, 2018). Pouco preocupante (Nielsen, C., Thompson, D., Kelly, M. & Lopez-Gonzalez, C.A. 2015.-IUCN, 2015).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Quati
Nome Científico: *Nasua nasua* (Linnaeus, 1766)
Ordem: Carnivora
Família: Procyonidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 82 e 120 cm.
Peso: 2,7 a 10 kg.
Alimentação: Insetos, aranhas, lagartos, pequenos roedores, ovos, aves, raízes, frutos e vegetais.
Habitat: Fragmento florestal e ambiente antropizado.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Emmons, L. & Helgen, K. 2016. -IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Ratão-do-banhado
Nome Científico: *Myocastor coypus* (Molina, 1782)
Ordem: Rodentia
Família: Myocastoridae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 105 cm.
Peso: 4 a 8 Kg.
Alimentação: Gramíneas, raízes, plantas aquáticas, mexilhões e gastrópodes.
Habitat: Vegetação próxima aos cursos d'água.
Distribuição geográfica: Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e São Paulo (Campinas a princípio). Província de Santiago (Chile), Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Ojeda, R., Bidau, C. & Emmons, L. 2016.-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Tamanduá-mirim
Nome Científico: *Tamandua tetradactyla* (Linnaeus, 1758)
Ordem: Pilosa
Família: Myrmecophagidae



Foto: Marcus Vinicius Lameiras

Tamanho: 87 cm a 145 cm.
Peso: 3 a 8,4 kg.
Alimentação: Formigas, abelhas e cupins.
Habitat: Área florestada e campo com capões.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Leste do Andes, Venezuela, Argentina e norte do Uruguai.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Miranda, F., Fallabrino, A., Arteaga, M., Tirira, D.G., Meritt, D.A. & Superina, M. 2014-IUCN, 2014).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Tatu-galinha
Nome Científico: *Dasypus novemcinctus* (Linnaeus, 1758)
Ordem: Cingulata
Família: Dasypodidae

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 68,5 a 102,3 cm.
Peso: 3,2 a 7,7 kg.
Alimentação: Invertebrados, pequenos vertebrados, ovos, fungos, frutos e raízes
Habitat: Floresta densa, fragmento florestal e plantações.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Do sul dos Estados Unidos, América Central até o noroeste da Argentina e do Uruguai.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Loughry, J., McDonough, C. & Abba, A.M. 2014.-IUNC, 2014).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Tatu-peludo
Nome Científico: *Euphractus sexcinctus* (Linnaeus, 1758)
Ordem: Cingulata
Família: Chlamyphorus

Foto: Cláudio Dias Timm

Tamanho: 51,9 a 64,1 cm.
Peso: 3,2 a 6,5 kg.
Alimentação: Raízes, frutos, invertebrados, pequenos vertebrados e carniça.
Habitat: Vegetação aberta e borda de floresta.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Do sul do Suriname até o nordeste da Argentina, Uruguai e Paraguai.
Nível de extinção: Pouco preocupante (Abba, A.M., Lima, E. & Superina, M. 2014-IUCN, 2014).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Veado-boró
Nome científico: *Mazama nana* (Hensel, 1872)
Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae

Foto : Rodolfo Capdeville

Tamanho: 93,1 cm.
Peso: Até 15 kg.
Alimentação: Flores, folhas e fruto.
Habitat: Floresta.
Distribuição geográfica: No brasil, região sul do Brasil e estado de São Paulo. Do sul do México, Bolívia, norte da Argentina.
Nível de extinção: Vulnerável (CONSEMA, 2011;Duarte, J.M.B, Vogliotti, A., Cartes, J.L. & Oliveira, M.L. 2015-IUCN, 2015; ICMBIO, 2018).

CIÊNCIASNATURAIS
museu

Nome popular: Veado-mateiro
Nome científico: *Mazama americana* (Erxleben,1777)
Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae

Foto: Marcus Vinicius Lameiras

Tamanho: 149 a 154 cm.
Peso: 25 a 30 kg.
Alimentação: Frutos, flores, gramíneas, leguminosas e arbustos.
Habitat: Floresta, fragmento florestal e mata ciliar.
Distribuição geográfica: Todo o Brasil. Do sul do México, Bolívia, Charco Paraguaio e norte da Argentina.
Nível de extinção: Em perigo (CONSEMA, 2011). Vulnerável (ICMBIO, 2018). Dados Insuficientes (Duarte, J.M.B & Vogliotti, A. 2016-IUCN, 2016).

CIÊNCIASNATURAIS
museu